

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 9-4-73006594

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

ET FRANCHE-COMTÉ - CÔTE-D'OR - SAÔNE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin N° 151 - 6 Avril 1979

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : Ainsi que nous l'avons publié dans le bulletin du 28 mars, les poiriers et pommiers doivent recevoir une application cuprique au fur et à mesure de leur arrivée aux stades C3/D.

OIDIUM DU POMMIER : Identifiables dès le départ de la végétation les bourgeons infestés responsables des contaminations futures, doivent être ramassés et brûlés.

Cette opération doit être suivie d'un traitement fongicide mixte avec celui contre la tavelure. De nombreux produits sont efficaces contre l'oïdium et présentent des actions secondaires intéressantes :

binapacryl (Ambox 50)	soufres
bupirimate (Nimrod)	triforine (Saprol, Funginex)
dinocap (Karathane...)	triadiméfon (Bayléton 5 PM)

Les benzimidazoles (bénomyl, carbendazime, méthyl-thiophanate) qui ont perdu de leur efficacité vis à vis des tavelures dans de nombreux secteurs (Voir notre bulletin N° 146 du 16 Février 1979) sont à proscrire, bien qu'efficaces contre l'oïdium.

MONILIA DU CERISIER ET DU PRUNIER : Les conditions actuelles étant très favorables à l'évolution de ces maladies, nous conseillons une nouvelle application fongicide au stade boutons floraux bien visibles (D/E) avec un produit de préférence polyvalent :

benzimidazoles (Benlate, Bavistine, Derosal, Sandomil, Pelt 44)
ou captane, folpel, mancozèbe, thirame (nombreuses spécialités).

CLOQUE DU PECHER - CLOQUE DU PRUNIER (MALADIE DES POCHETTES) : A la suite du temps pluvieux favorable à des contaminations successives une application ou son renouvellement est conseillée avec captane, thirame, zirame.

GRANDES CULTURES

CEREALES : Des attaques de Rhynchosporiose sont signalées localement sur orges d'hiver et escourgeons. Compte tenu de la forte humidité actuelle et des basses températures favorables à la maladie nous demandons une certaine vigilance.

COLZA : Rien à signaler à ce jour.

CULTURES LEGUMIERES

DESHERBAGE DU FRAISIER : Avant reprise de la végétation utiliser :

lénacile (Venzar : 2 kg) chloroxuron (Ténoran : 7 kg/Ha) ou chlorthal (Dacthal : 10 kg/Ha).

Entre rangs, on peut employer du paraquat (Gramoxone 2 : 3 à 4 l./Ha).

DESHERBAGE DES ASPERGES : Avant la levée des adventices on peut employer :

diuron (Karmex ... 2 kg)	linuron (Sarclex... 1,5 kg)
monuron (Telvar 2 kg)	métribuzine (Sencoral 1,25 kg) etc ...

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de Circonscription Adjoint

G. RIFFIOD.